

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

7 Juin 1982

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHON, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de l'ARDECHE et de la DROME

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription 24, Rue Edouard Delanglade - 13008 MARSEILLE

Station d'Alertissements Quartier Cantarel MONTFAVET Adresse Postale B.P. 95 84140 MONTFAVET TELEPHONE (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

VIGNE

SPECIAL CORSE N° 7

TORDEUSES DE LA GRAPPE

Dans la région au Nord d'Aléria jusqu'à Pianiccia ainsi que dans la zone Sud de Ghisonaccia des taux d'attaques importants dépassant largement 100 glomérules pour 100 grappes sont actuellement observés.

Dans ces situations intervenir dès maintenant avec un produit à action curative. Dans la plupart des autres vignobles de l'île une intervention n'est pas nécessaire.

MILDIOU

Deux nouveaux foyers ont été découverts en Casinca et à Ghisonaccia. Si ce n'est déjà fait, réaliser sans tarder le traitement préventif que nous avons préconisé juste avant le début de la floraison.

OIDIUM

D'importantes attaques sur grappes sont dès à présent observées sur cépages sensibles. Un poudrage de soufre pendant la pleine floraison est fortement recommandé. Si une intervention contre les Tordeuses de la grappe est nécessaire, on pourra effectuer judicieusement un poudrage d'un mélange soufre + insecticide.

CULTURES MARAICHÈRES

THRIPS DU POIREAU

Des pullulations de cet insecte minuscule qui provoque une coloration argentée des plantes suivie d'un dessèchement des extrémités des feuilles et d'un dépérissement général de la plante sont fréquentes sur ail, oignon et poireau.

Si nécessaire intervenir avec une des matières actives suivantes :

azinphos, parathion méthyl, méthidathion, tétrachlorvinphos, deltaméthrine ou cyperméthrine.

ROUILLE DU POIREAU

Des débuts d'attaques sont signalés localement en haute Corse. Cette maladie peut être combattue avec un produit contenant du manèbe.

MOUCHE DE LA CAROTTE

Quelques dégâts sont observés dans la région d'Ajaccio sur jeunes carottes. Dans les parcelles contaminées effectuer une pulvérisation avec un des produits suivants :

bromophos (Nexagan, Nexion), chlorfenvinphos (Birlane), diéthion (Rhodocide) ou trichloronate (Phytosol).

----- PM